



- Ranger dans un même lieu à l'abri de la poussière et de la chaleur
- Signaler sur la porte par une étiquette la présence de la trousse d'urgence.
- La trousse d'urgence doit être présentée à tout nouveau personnel du cabinet

Date de la prochaine révision :

(1^{er} médicament ou matériel à se périmé dans la trousse, à enregistrer sur l'agenda)

Matériel

Matériel	Date de péremption du matériel ou des piles
Masques haute concentration d'oxygène (usage unique, 2 à 3 tailles)	
BAVU (Ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle)	
Tensiomètre automatisé (Conserver les piles hors de l'appareil pour éviter de les décharger)	
Défibrillateur externe automatique ou semi-automatique	
Oxymètre de pouls	
Bandelettes réactive de glycémie	
Lecteur de glycémie (Conserver les piles hors de l'appareil pour éviter de les décharger)	
Compresse stériles	
Aiguilles sous-cutanées	
Pansements	
Mémos : « Les urgences médicales au cabinet dentaire » Guide ADF ou Guide UFSBD	

Médicaments

(A ranger dans une boîte hermétique)

Médicaments DCI	Indications	Contre-indications ou précautions	Utilisation	Date de péremption
DESLORATADINE	Manifestations allergiques	Grossesse, allaitement.	1 cp à avaler en cas de manifestations allergiques (urticaire, œdème de Quincke si déglutition possible, choc anaphylactique)	
ALPRAZOLAM 0,25 mg	Crise d'angoisse Convulsions	Insuffisance hépatique grave, insuffisance respiratoire grave	1 cp à faire fondre sous la langue	
ADRENALINE 300 µg Solution Injectable ADULTE	Allergie : • Etat de choc anaphylactique de l'adulte, ou de l'enfant de plus de 30 kg • Œdème de Quincke avec signes respiratoires	À n'utiliser qu'en cas d'extrême nécessité chez les patients aux antécédents cardiaques, en particulier coronarien	1 injection IM (stylo prêt à l'emploi) dans la face antéro-latérale de la cuisse Effets secondaires possibles : palpitations, tachycardie, sueurs, tremblements, nausées	
ADRENALINE 150 µg Solution Injectable ENFANT	Allergie : • Enfant moins de 30 kg • Œdème de Quincke avec signes respiratoires		1 injection IM (stylo prêt à l'emploi) dans la face antéro-latérale de la cuisse Effets secondaires possibles : palpitations, tachycardie, sueurs, tremblements, nausées	

Médicaments	Indications	Contre-indications ou précautions	Utilisation	Date de péremption
ACIDE ACETYLSALICYLIQUE 160 µg	Après avis du SAMU pour syndrome coronarien aigu	Seule contre-indications en urgence : l'allergie	A diluer dans un fond d'eau à avaler	
ATROPINE 0,5 mg Ampoules de 1ml	Bradycardie Malaise vagal prolongé avec fréquence cardiaque basse (pouls < 60/minute)	Grossesse, allaitement, glaucome	Aspirer une ampoule de 1 ml dans une seringue de 2 ml et injecter après purge de l'air en sous-cutané ou en intramusculaire.	
ALCOOL BENZYLIQUE 4 % + BENZALKONIUM CHLORURE 0.025 % + CHLORHEXIDINE GLUCONATE 0.25 % Spray	Désinfection cutanée avant injection		En application cutanée avec une compresse	
GLUCAGON Seringue prédosée de 1 ml	Patient diabétique présentant une hypoglycémie avec troubles de conscience	phéochromocytome hyperglycémie	Vider la seringue préremplie dans le flacon de poudre, agiter doucement et aspirer dans la seringue. Injection, après purge, en sous cutané ou en intramusculaire	
GLUCOSE Ampoules • Boisson sucrée (sirop de fruits, sucre en poudre à diluer dans de l'eau)	Patient diabétique présentant une hypoglycémie sans trouble de conscience	hyperglycémie	A faire boire au patient, s'il conserve ses réflexes de déglutition. A renouveler si besoin.	
OXYGENE MEDICAL	Insuffisance respiratoire, dyspnée avec désaturation, patient inconscient...	<ul style="list-style-type: none"> • Graisse (sur main ou visage risque d'inflammation) • Flamme ou corps incandescent à proximité 	Patient conscient 9 l/min Insufflation par ballon (patient inconscient) 15 l/min	
PARACETAMOL CODEINE (500 /30) Cp effervescents	Traitement préventif ou curatif des douleurs d'intensité modérée à intense chez l'adulte (La dose doit être adaptée pour l'enfant)	<ul style="list-style-type: none"> • Pathologie hépatique • Allergie • Asthme ou insuffisance respiratoire 	1 à 2 comprimés à dissoudre dans un fond d'eau. Délai d'action 30 min	
PARACETAMOL 500 mg Cp effervescents	Traitement préventif ou curatif des douleurs d'intensité faible à modérée chez l'adulte (La dose doit être adaptée pour l'enfant)	<ul style="list-style-type: none"> • Pathologie hépatique • Allergie 	1 à 2 comprimés à dissoudre dans un fond d'eau. Délai d'action 30 min	
PREDNISOLONE 20 MG Cp Orodispersible	Oedème de Quincke sans signe respiratoire		1 mg/kg soit 4 comprimés pour un patient de 80 kg, à mettre dans la bouche pour délitement dans la salive, sinon le déliter au préalable dans l'eau	
SALBUTAMOL Aérosol	Crise d'asthme		2 bouffées en inhalation, à renouveler quelques minutes plus tard si la gêne persiste.	
TRINITRINE 0,30 mg	Douleur thoracique d'allure coronarienne	Ne pas utiliser en cas d'hypotension (Tension artérielle <10)	1 bouffée sous la langue, à renouveler si besoin 2 minutes plus tard. (laisser le patient au repos pendant 15 min puis le lever doucement pour éviter une hypotension orthostatique	
TERBUTALINE 0,5 mg/ml Ampoules de 1ml	Asthme résistant à l'aérosol de Salbutamol		1ml en injection sous-cutanée	